

بسمه تعالی

فرم تدوین راهنمای تجویز ریتوکسیماب در بیماری میاستنی گراو

نام دارو	کاربرد دارو	افراد صاحب صلاحیت جهت تجویز	شرط تجویز		محل مصرف دارو	دوز و تواتر مصرف دارو	اقدامات مورد نیاز قبل از تجویز دارو
			اندیکاسیون	کنترا اندیکاسیون			
AMP: Rituximab 100 و 500 میلی گرم	جهت کنترل بیماری میاستنی گراو	نورولوژیست و نورولوژیست فلوشیپ نوروماسکولار	۱. میاستنی گراو Anti-MuSK مثبت ۲. میاستنی گراو ژنرالیزه مقاوم به پردنیزولون و داروهای ایمنوساپرسیو ۳. منع مصرف یا عوارض جدی با سایر داروهای ایمنوساپرسیو	مطلق: همزمان با عفونت فعال / کنسر فعال و درمان نشده / نارسایی قلبی کلاس ۴ / هرگونه واکنش های تهدید کننده حیات حساسیت به دارو/ هپاتیت B و C بدون درمان نسبی: آریتمی / ترومبوسیتوپنی / لکوپنی / نارسایی کلیه	بستری در بخش یا دی کلینیک	بزرگسال دوز اولیه یک گرم (یکبار یا دوبار بفاصله دو هفته) و سپس ۵۰۰-۱۰۰۰ میلی گرم هر ۳-۶ ماه یا بر اساس CD19%	CBC, HbsAg, HbsAb, HbcAb, PPD, HCVAb نوار قلب / رد عفونت های زمینه ای

- تاریخ اعتبار این راهنما از زمان ابلاغ به مدت ۳ سال می باشد و بعد از اتمام مهلت زمانی میبایست ویرایش صورت پذیرد.

